

Protocolo de atención urgencias y emergencias cardíacas



**Solicitar ayuda
en la línea segura**



Cadena de supervivencia para atención de un paciente en paro cardiorespiratorio:

1. Contacto con el paciente y activación del sistema de emergencia.
2. Compresiones torácicas efectivas.
3. Desfibrilación rápida.
4. Entrega a personal de ambulancia

C-A-B

**(Compresiones torácicas – mantener vía
aérea – ventilación efectiva)**



* Verifique que el indicador
del equipo este en verde



Paso N°1

**Hacer contacto con el paciente y pida
ayuda (solicite el DEA): No dedique
más de 2 segundos para identificar el
estado del paciente e inicie la
reanimación cardiopulmonar RCP.**

- Persona con ausencia de respuesta.
- Persona con ausencia de respiración.
- Persona con ausencia de pulso.

Paso N°2

Llega el DEA



- Abre la tapa del DEA.
- Retire la ropa del pecho del paciente.
- Asegúrese que la piel del paciente esté limpia y seca.

No suspenda compresiones torácicas mientras otra persona colabora con estas indicaciones

Paso N°3

Ubicación electrodos (No suspenda las compresiones torácicas).

- Abra el paquete de los electrodos.
- Quite el film plástico de uno de los electrodos.
- Coloque uno de los electrodos en la parte superior derecha de la caja torácica.
- Despegue el segundo electrodo y colóquelo en la parte inferior izquierda de la caja torácica.



Paso N°4

Reanimación cardiopulmonar

No suspenda la RCP - Compresiones Torácicas - para aumentar supervivencia).

- Incline la cabeza del paciente hacia atrás para despejar vía aérea.
- Inicie RCP con 30 compresiones y dos respiraciones, si es un solo auxiliador. En caso de ser dos auxiliadores, dar 15 compresiones y dos respiraciones.